

¿Cuáles Son Mis Opciones para el Tratamiento de Pérdida Temprana de Embarazo (Aborto Espontáneo)?

	Observar y Esperar	Medicamentos	Procedimiento
¿Cómo funciona?	Espera que los productos del embarazo pasen. Esto ocurre con calambres y sangrado con coágulos.	Pastillas llamadas mifepristona y misoprostol se pueden usar juntas para ayudar pasar los productos del embarazo. También puede usar solo pastillas de misoprostol. Las pastillas se usan en su casa.	Un proveedor de salud remueve los productos del embarazo utilizando un procedimiento de succión suave. Esto se puede hacer con anestesia local o con sedación.
¿Qué pasará?	Espera que los calambres y el sangrado sucedan. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Es muy probable que el sangrado y los calambres sean más fuertes que un período, con sangrado abundante que dura por unas horas. Sangrado más leve suele durar de 1 a 2 semanas y puede aparecer y desaparecer.	Si la usa, primero tome una pastilla de mifepristona. Luego, 24 horas después, coloque las pastillas de misoprostol en su vagina o en sus mejillas. Tome pastillas para el dolor una hora antes de las pastillas de misoprostol para aliviar los calambres y el sangrado. Las pastillas de misoprostol pueden causar náuseas, diarrea y /o fiebre baja. Tendrá calambres y sangrado más intensos que un período. Esto comienza 2-6 horas después de tomar las pastillas. Sangrado más leve suele durar de 1 a 2 semanas y puede aparecer y desaparecer varias veces.	El procedimiento se lleva a cabo en el consultorio. El proveedor de salud extrae los productos del embarazo usando un dispositivo manual. Puede tener un sangrado leve y calambres por 3-7 días.
¿Qué tan doloroso es?	Puede tener calambres intensos. Pastillas para el dolor y una almohadilla caliente puede ayudar a aliviar los calambres dolorosos.	Tendrá calambres intensos. Pastillas para el dolor y una almohadilla caliente puede ayudar a aliviar los calambres dolorosos.	Puede tener calambres leves a fuertes durante el procedimiento.
¿Qué tan bien funciona?	Funciona 70-80% del tiempo. Funciona mejor si ya ha tenido algo de sangrado.	Las pastillas funcionan 75-90% del tiempo.*	El procedimiento funciona 98-100% del tiempo.
¿Cuánto tiempo tarda?	Puede durar algunas semanas.	En el 84% de las personas que usan píldoras, el útero se vacía en 2 días.*	El útero se vacía durante el procedimiento, que dura entre 5 y 10 minutos.
¿Qué pasa si tarda demasiado tiempo o no funciona?	Si tarda demasiado tiempo, puede volver a su proveedor de salud en cualquier momento por las pastillas o un procedimiento de succión suave.	Si no funciona o tarda demasiado tiempo, puede volver para un procedimiento de succión suave o puede usar las pastillas otra vez.	En el caso raro de que esto no funciona, usted puede volver para otro procedimiento de.
¿Es seguro?	Sí. Las tres opciones son seguras.		
¿Puedo tener hijos después?	Sí. Estos tratamientos no impiden que se embarace o que se quede embarazada en el futuro. Una vez que la pérdida temprana de embarazo se termine, puede empezar a tratar de quedar embarazada tan pronto como se sienta lista.		
¿Qué causó la pérdida temprana de embarazo?	Una pérdida temprana de embarazo casi nunca es causada por algo que hizo. Una de cada cuatro personas sufre una pérdida temprana de embarazo. No entendemos completamente todas las razones que las pérdidas tempranas de embarazo ocurren. NO es causado por el estrés, los deportes, la comida, ni el sexo.		

*Mifepristona no siempre está disponible. Con la mifepristona, la tasa de éxito es 84% en 2 días y 89% en 8 días. Usando solo misoprostol, la tasa de éxito es 67% en 2 días y del 84% en 8 días.